

ISOMATE A/OFM

ΔΙΑΧΥΤΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΔΙΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Περιεχόμενο:
διαχυτήρες / φάκελο

80 100 400
200 500

Αριθμός Άδειας
Διάθεσης στην Αγορά: 9065
Ημ/νία χορήγησης: 22-10-2012

Κάτοχος της άδειας:

CBC (Europe) Srl - Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG) - Ιταλία
Υπευθυνός για την τελική διάθεση
στην αγορά:



anthesis
Blooming together

Member of Andermatt Group

ANTHESIS IKE

Εμ. Μνεσκό 8, 14561 Κηφισιά Τ 210 8012367
E info@anthesis.gr www.anthesis.gr

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία περίπου 300 mg /	Διαχυτήρα
Καθαρό περιεχόμενο δ.ο. /	Διαχυτήρα
Anarsia lineatella pheromone:	97,6 mg
(E)-5-Decenyl acetate	92,2 mg
(E)-5-Decen-1-ol	5,4 mg
+	
Grapholtha molesta pheromone:	176,8 mg
(Z)-8-Dodeceny acetate:	164,8 mg
(E)-8-Dodeceny acetate:	10,7 mg
(Z)-8-Dodecen-1-ol:	1,3 mg
Βοηθητικές ουσίες:	94 mg

Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο πεκ.υγρού
		Σκεύασμα Διαχυτήρες / στρέμμα	Διαχυτήρες	
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Δαμασκηνιά Κερσαία Βυσινιά	Ανάρσια (Anarsia lineatella) Καρπόκαμα (Grapholtha molesta)	80-100 ^{1,2} Διαχυτήρες	1 ³	

Παρατηρήσεις:

- (1) Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή των φυτών και την πίεση της προσβολής.
 - (2) Στην περίπτωση του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.
 - (3) Η εφαρμογή μπορεί να επαληθευθεί αν διαπιστωθεί ανάγκη με βάση τις συλλήψεις των παγιδιών παρακολούθησης ή τις παρατηρήσεις προσβολής στον αγρό.
- Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. Ελέγχετε επίσης τα καρπίδια κάθε 1 - 2 εβδομάδες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ανοίξτε τη συσκευασία με προσοχή ώστε να μην σπασεί ο διαχυτήρας. Οι διαχυτήρες Isomate A/OFM αφού ανοικτούν, αναρτώνται – ομοιόμορφα κατανεμημένοι - σε κλαδιά που βρίσκονται στο 1/3 πάνω (υψηλότερο) μέρος των δένδρων, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομονών. Σε δέντρα χωρίς μεγαλύτερο από 4 μέτρα συνιστάται να τοποθετηθεί το 1/3 των διαχυτήρων στο πάνω μέρος των δένδρων και τα 2/3 στο χαμηλότερο μέρος των δένδρων.

Συμπληρωματικοί διαχυτήρες τοποθετούνται στα όρια των οπωρώνων κοντά στις κορυφές των δέντρων.

Χρόνος εφαρμογής:

Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring) και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διακινιμάζεις, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων. Οι διαχυτήρες παραμένουν στον αγρό για τουλάχιστον 150 ημέρες, ανάλογα με την θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανέμου.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριψύμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριψύμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμιαία άτομα του εντόμου - στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμιαία άτομα και δεν έχει καμιο επίδραση στα θηλυκά ακμιαία, στα αυγά ή τις προνύμφες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλεστεί:

- Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλό πληθυσμό εντόμων. Στις περιπτώσεις μεσοκίων και μεγάλων πληθυσμών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνει συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου, ειδικά για την καταπολέμηση της πρώτης γενιάς.
- Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές, γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν περιοδικό έλεγχο στα φρούτα για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο.
- Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλα αγροτεμάχια ή όταν τοποθετούνται διαχυτήρες σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατεύσουν ακόμα και μικρούς οπωρώνες όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλό πληθυσμό εντόμων.
- Δεν συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος σε μικρά αγροτεμάχια που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωρώνες ή σε αγροτεμάχια με εξαιρετικά ακανόνιστο και ημιοντικό περιμετρο. Το ελάχιστο εμβόδιον για την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 στρέμματα.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε επαφή με την καλλιέργεια)

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική απαροβασίσι συσκευασία του, σε θερμοκρασίες κάτω των 50°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιας επιπτώσεις



Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Προφυλάξεις:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρίβετε, μην πίνετε, μην καννίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας. Μη μολύνετε άλλες καλλιέργειες, νερό και τρόφιμα κατά την αποθήκευση και τη χρήση. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για μερικά λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια το γρηγορότερο δυνατόν. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

UFI TD70-G0AP-A00H-JYWN

Αριθμός παρτίδας/ ημερομηνία Παραγωγής: βλ. επί της συσκευασίας

