

ISOMATE CTT

ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ ΣΕ ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΙΑ

Περιεχόμενο:
400 διαχυτήρες / φάκελο

Αριθμός Αδειας
Διάθεσης στην Αγορά: 9067

Ημ/νία χορήγησης: 17-03-2014

Κάτοχος CBC (Europe) Srl - Via Zanica, 25
της άδειας: 24050 Grassobbio (BG) - Ιταλία

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:



ANTHESIS IKE
Εμ. Μπενάκη 8, 14561 Κηφισιά Τ 210 8012367
E info@anthesis.gr www.anthesis.gr
Παρασκευαστής του σκευάσματος:
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Ιαπωνία

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

380 mg min / διαχυτήρα:
(Ε,Ε)-8,10-Dodecadien-1-ol (54% β/β) +
Dodecanol-1-ol (28.8%β/β) +
Tetradecanol-1-ol (6.9%β/β)
Βοηθητικές ουσίες 3,1%β/β

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκευάσμα (Διαχυτήρες) / Στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Μηλιά Αχλαδιά Καρυδιά Κυδωνιά Αχλαδομηλιά	Καρπόκαψα Cydia pomonella	50 Διαχυτήρες (2)	Βλ. Σημ (1), (3) & (4)	1

Παρατηρήσεις:

- (1) Τοποθετείτε τους διαχυτήρες την άνοιξη, πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.
- (2) Ο αριθμός των διαχυτήρων/στρ. καθορίζεται ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή του οπωρώνα και την πίεση της προσβολής.
- (3) Στην περίπτωση του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.
- (4) Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. Ελέγχετε επίσης τους βλαστούς και τα καρπίδια κάθε 2 εβδομάδες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε επαφή με την καλλιέργεια).

Προφυλάξεις:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλυθείτε σχολαστικά με πολύ νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας.

Μην ρυπαίνεται το νερό με το σκευάσμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

UFI 6810-X01F-F00J-Y6M3

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική αλληλεπίδραση συσκευασίας του, σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C. Φυλάξτε το μακριά από τη θερμότητα, το ηλιακό φως και πιθανές πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμός παρτίδας/ ημερομηνία Παραγωγής: βλ. επί της συσκευασίας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**