

# MISTER C

Φερομόνη φύλλου για την καταπολέμηση της καρπόκακας (*Cydia pomonella*)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΔΑΔΑ): 9079/30.03.2017

ΑΕ (αερόλυμα, αεροζόλ)

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

## Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: (E,E)-8,10-Dodecaldien-1-ol (Codlemone).....209 g/kg  
Βοηθητικές ουσίες ..... 77,8 % β/β



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**Δηλώσεις επικινδυνότητας:** Εξαιρετικά εύφλεγκο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

**Δηλώσεις Προφύλαξης:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα/πυρσινθές/υμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Περιέχτης υπό πίεση. Να μην τρυπιθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Αποφύγετε να αναπνεύτε σκευάσματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Μην ρουπιάνε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του  
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες – Αντιδοτό:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα

**Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777**

**Κάτοχος της άδειας:** CBC (Europe) S.r.l.  
Via Zanica 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Ιταλία  
Τηλ.: +39-035-335313 - Fax: +39-035-335334

**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**  
Anthesis IKE Εμ. Μπενάκη 8, 14561 Κηφισιά

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 190 g

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Φερομόνη φύλλου για την καταπολέμηση της καρπόκακας (*Cydia pomonella*). Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμιαία άτομα του εντόμου-στόχου παρεμποδίζοντας τη σύζευξη των εντόμων. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμιαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμιαία, τα αυγά ή τις προνύμφες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Τοποθετήστε το δοχείο του προϊόντος στην συσκευή αυτόματης διάχυσης, που απελευθερώνει καθημερινά, με ακρίβεια, την απαιτούμενη ποσότητα φερομόνης, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Αναρτήστε τη συσκευή σε κλαδί ή πιάσαλο στο ανώτερο 1/3 της κομής του δέντρου και ένα μέτρο μακριά από καρπούς.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:** Τα χρησιμοποιούμενα κόντρα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να αναποστίνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το πλήρες άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Μην το καταστρέψετε ή το θάψετε ακόμη και μετά τη χρήση.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Περίο Εφαρμογής, Στόχος, Δοχεία / 10 στρ., Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: **ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ:** Μηλιά, Αχλαδιά, Καρυδιά, **Φυιτωκίαι:** Καρπόκακας (*Cydia pomonella*), 2-3 δοχεία (κόντρα) του 10 στρ., Πριν την έναρξη της πτήσης της 1<sup>ης</sup> γενιάς.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Τοποθετήστε το δοχείο του προϊόντος (κόντρα) στην συσκευή αυτόματης διάχυσης (πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμιαίων του εντόμου.

(2) Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιήστε παλιές παρακολούθησης, ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις και συμβουλευτείτε τις Γεωργικές Πραξοδημοσιεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν αρχίσει η πτήση των ακμιαίων της γενιάς που διαχεμαζόε.

(3) Μία εφαρμογή αρκεί για να καλύψει όλη την καλλιεργητική περίοδο, ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές συνθήκες

(4) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση των 375 γραμ δ.α./10 στρέμματα ανά καλλιεργητική περίοδο (έως 5 δοχεία σκευάσματος /10 στρέμματα)

(5) Μετά τον προγραμματισμό και την τοποθέτηση των απαιτούμενων συσκευών αυτόματης διάχυσης, σύμφωνα με την συσταζόμενη δόση (ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλέργειας και την πίεση της προσβολής), ενεργοποιήστε το MISTER C.

(6) Τοποθετήστε ομοίωμαφα τα δοχεία του MISTER C μέσα στο αγροτεμάχιο, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη συγκέντρωση της φερομόνης, όπως ο άνεμος, η τοπογραφία, η διάταξη των φυτών και η πιθανότητα προσβολών από γεννητικούς σπαρώνες.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτωγικές ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί :** Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλας σπαρώνες ή όταν τοποθετούνται διαχυτήρες σε μεγάλη έκταση.

Μπορούν να προστατεύουν ακόμα και μικρούς σπαρώνες, όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων ή όταν οι γεννητικοί σπαρώνες ακολουθούν επίσης παρόμοια προγράμματα αντιμετώπισης του εντόμου. Προστατεύονται χαμηλούς πληθυσμούς εντόμων, προστατεύονται επαρκώς με το MISTER C.

Σε αγρούς με μεσαίους και υψηλούς πληθυσμούς είναι απαραίτητη η συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων, ειδικά το πρώτο έτος και στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, για να μειωθεί ο πληθυσμός του εντόμου.

Η συνδυασμένη χρήση εντομοκτόνων δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του MISTER C.

Γονιμοποιημένα θηλυκά που προσέρχονται από γεννητικούς αγρούς μπορεί να προκαλέσουν ζημιές, γι αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικά ελέγχοι στους καρπούς, ώστε να αποφασιστεί εάν χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο. Σε περίπτωση εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών - 50 καρποί στην άκρη του αγροτεμαχίου ή, 100 στο κέντρο του - πραγματοποιήστε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα.

**Στοιχεία φωτοεξοκρίτηρας:** Δεν είναι φωτοεξοκρίτης στις συνιστάμενες καλλέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Όλες οι καλλέργειες: 0 ημέρες

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε ξηρά, δροσερά (σε θερμοκρασία 20°C) και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 1 χρόνο. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης, θερμότητας και ηλιακό φως. Προστατέψτε το προϊόν από έκθεση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50°C.

LF1 code: 5506-YOC-AH-K007-1917



002848

81 050539

EL

Rev. 03-2023

520 3

BIOGARD<sup>®</sup>  
biological First.