

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο (FPP2, P2 ή παρόμοια) κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή και τον καθαρισμό του εξοπλισμού.

Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, στους 4°C μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Αποφύγετε την έκθεσή του στο άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να αποθηκευθεί για 18 μήνες στους 4°C και για 4 μήνες στους 25°C από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας.

Περιεχόμενο: 1 Kg



Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση : Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901 18% β/β.

Βοηθητικές ουσίες: 82 % (β/β)

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του αλευρώδους και του θρίπα σε καλλιέργειες θερμκηπίου

Περιέχει Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος και της αναπνευστικής οδού.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14754

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός καλύψεως με 50-100 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό και αναδεύεται καλά μέχρι να σχηματιστεί παλτός. Μην αφήνετε τον παλτό να ηρεμήσει ή να εκτεθεί στον ήλιο. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τον παλτό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Ψεκάστε αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. Τρόπος δράσης: Όταν έλθουν σε επαφή τα σπόρια του μύκητα με το παθογόνο έντομο, βλαστώνουν και πολλαπλασιάζονται στο σώμα του εντόμου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα
		γρ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.)		
Τομάτα (Θ) LYPES Πλεπριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Άλευρώδης Trialeurodes vaporariorum TRIAVA Bemisia tabaci BEMITA Θρίπτας Frankliniella occidentalis FRANOC	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από τα στάδια της πλήρους ανάπτυξης των καυληρόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 10-89	1-4/5-7
Πεπόνι (Θ) CUMME Καλοκύθα (Θ) CUUPE Καλοκύθα (Θ) CUUPE Αγγούρι (Θ) CUMSA Αγγουράκι (Θ) KIAST	Άλευρώδης Trialeurodes vaporariorum TRIAVA Bemisia tabaci BEMITA	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από τα στάδια της πλήρους ανάπτυξης των καυληρόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 10-89	1-4/5-7
Φασόλι νωπό με λοβό (Θ) PHSVX	Άλευρώδης Trialeurodes vaporariorum TRIAVA Bemisia tabaci BEMITA	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των καυληρόνων έως την πλήρη ωρίμανση των λοβών BBCH 10-89	1-4/5-7
Φακή (Θ) LENCU	Άλευρώδης Trialeurodes vaporariorum TRIAVA Bemisia tabaci BEMITA	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των καυληρόνων έως την πλήρη ωρίμανση των λοβών BBCH 10-89	1-4/5-7
Καλλωπιστικά (Θ) NNZZ	Άλευρώδης Trialeurodes vaporariorum TRIAVA Bemisia tabaci BEMITA	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός	1-4/5-7
Παρατηρήσεις: 1. Το σκεύασμα είναι αποτελεσματικότερο όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 15 και 30°C και οι συνθήκες δεν είναι υπερβολικά υγρές. Εκτός αυτής της περιοχής θερμοκρασιών, η αποτελεσματικότητά του μπορεί να μειωθεί, αλλά τα σπορία του παραμένουν βιώσιμα έως και εάν η θερμοκρασία ανέλθει πάνω από 40°C, οπότε η βιωσιμότητα των σπορίων μειώνεται γρήγορα. 2. Αποφύγετε τις αναμειγνύσεις του σκευάσματος με μικροκτόνα ή την ταυτόχρονη εφαρμογή τους.					

Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): Για όλες τις καλλιέργειες εφαρμόζονται από 1 – 4 ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα 5 – 7 ημέρες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Δεν ορίζεται. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνιστάται να συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.



Κάτοχος της άδειας: FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.
Avda. Del Cadi 19-23 Pol. Ind. St. Pere Molanta
08799 Olerdola, Barcelona, Ισπανία
Τηλ.: +34 938182891 Fax: +34 938921726
E-mail: info@futurecobioscience.com



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8, 14561
Κηφισιά - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 8012367
E-mail: info@anthesis.gr

