RAPAX AS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια καταπόσεως του *Bacillus thuringiensis*.
Οι παραγόμενες πρωτεΐνες (τοξίνες) του βακίλλου με κρυσταλλική μορφή, καταστρέφουν τα επιθηλιακά κύτταρα στο μεσέντερο των εντόμων με αποτέλεσμα την καταστροφή του εντερικού σωλήνα και τον θάνατο των προνυμφών σε διάστημα λίγων ημερών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με συμβατικούς ψεκαστήρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό μίγμα να χρησιμοποιείται μέσα σε 12 ώρες μετά από την παρασκευή του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει πρέπει να αραιώνεται με νερό και να ψεκάζεται στην περιοχή που έχει ήδη γίνει εφαρμογή. Οι κενές φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό), και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, και εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Περιέχει *Bacillus thuringiensis* subspecies *kurstaki* strain EG 2348. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη / φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
Οι εργάτες να φορούν ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα άμεσα με νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός επιμένει.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε άμεσα με νερό και σαπούνι την περιοχή που έχει έλθει σε επαφή με το προϊόν.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 7793777

8 050539 000424

RAPAX® AS

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain EG 2348, 22,56 % β/ο ή 24.000 IU T.ni/mg

Βοηθητικές ουσίες: 81,2 % (β/β)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 14753 /31.08.2020

Andromali Anthesis

Εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848.

BIOGARD biological First.

Κάτοχος της άδειας: CBC (Europe) S.r.l.
Via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG), Ιταλία
T: 0039-035-335313 F: 0039-035-335334
E: infobiogard@cbceurope.it

anthesis Blooming together

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Anthesis ΙΚΕ
Εμ. Μπενάκη 8 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
T: 210-8012 367 E: info@anthesis.gr

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 L

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ).

- **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:** Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Πράσινα λεμόνια (λάιμ), Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ: Ανθοτρήτης *(Prays citri)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΜΗΛΟΕΙΔΗ:** Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: Φυλλοδέτες: *(Pandemis cerasana, Archips podana)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασία: Καρπόκαψα *(Cydia molesta)*, Ανάρσια *(Anarsia lineatella)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΑΜΠΕΛΙ:** (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια) Ευδεμίδα *(Lobesia botrana)* Εφέστια *(Ephestia spp.)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 10 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΕΛΙΑ**
Πυρηνοτρήτης *(Prays oleae)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των καρπών και σπόρων (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ**
Προνύμφες λεπιδοπτέρων *(Argyrotaenia pulchelana)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7–10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΣΟΛΑΝΩΔΗ:** Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ)
Σποντόπτερα *(Spodoptera littoralis)*, Φυλλορύκτης τομάτας *(Tuta absoluta)*, Πράσινο σκουλήκι *(Helicoverpa armigera)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΣΟΛΑΝΩΔΗ:** Τομάτα (Υ), Πιπεριά (Υ)
Σποντόπτερα *(Spodoptera littoralis)*, Φυλλορύκτης τομάτας *(Tuta absoluta)*, Πράσινο σκουλήκι *(Helicoverpa armigera)*, *Spodoptera frugiperda* ** (Χρ.Ηα Σημ.). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΑΓΚΙΝΑΡΑ**
Κάμπια αγκινάρας *(Gortyna xanthenes)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση του φυλλώματος (BBCH≥19) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 100 λίτρα / στρέμμα.
- **ΦΑΣΟΛΙΑ** (Υ+Θ) (φρέσκα και ξηρά)
Πράσινο σκουλήκι *(Helicoverpa armigera)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα.Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 100 λίτρα / στρέμμα.
- **ΒΑΜΒΑΚΙ**
Πράσινο σκουλήκι *(Helicoverpa armigera)*, *(Spodoptera frugiperda)* (Χρ.Ηα.Σημ.)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των καρυδιών (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΚΑΠΝΟΣ**
Πράσινο σκουλήκι *(Helicoverpa armigera)*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση του συγκομιζόμενου φυλλώματος (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ**
Φυλλοφάγες προνύμφες: Πιτυοκάμπη *(Thaumetopoea pityocampa, Thaumetopoea processionea)*. Ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH>80) με μεσοδιαστήματα 7– 10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 200 λίτρα / στρέμμα.
- **ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ**
*(Spodoptera frugiperda)***. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των καρπών (BBCH>80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Δόση: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. (Χρ.Ηα.Σημ.)
- **ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ)**
*(Spodoptera frugiperda)***. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των καρπών (BBCH>80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Δόση: 100-200 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. (Χρ.Ηα.Σημ.)

Παρατηρήσεις:
1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλή διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα.
Μετά την κατάποση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.
2. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.
3. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
4. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.
* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες της τομάτας (Υ), πιπεριάς (Υ) και του βαμβακιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.
**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φράουλας και του αραβοσίτου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητά ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Πράσινα λεμόνια, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασία), ΑΜΠΕΛΙ (οινοποίησιμα και επιτραπέζια σταφύλια), ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ+Θ) (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα), ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ (Υ+Θ) (φρέσκα και ξηρά), ΒΑΜΒΑΚΙ, ΚΑΠΝΟΣ, ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ, ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ): 3

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Όλες οι καλλιέργειες:
Δεν ορίζεται

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain (EG 2348), που ανήκει στην ομάδα 11 κατά IRAC.

Να μη χρησιμοποιείτε νερό για ψεκασμό με pH άνω του 8, αλλιώς να χρησιμοποιείτε παράγοντα οξίνισης.
Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά προϊόντα όπως Βορδιγάλειος πολτός, πολυθειούχο ασβέστιο κλπ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) το προϊόν παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Κλείστε ξανά τη συσκευασία εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί όλο το περιεχόμενο.

Αρ. Παρτίδας - Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί συσκευασίας