



Το προϊόν ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό EC 1272/2008

Συμμορφωθείτε με την EC 1272/2008

NITROSPEED 39



ΠΡΟΣΟΧΗ

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΠΡΟΛΗΨΗ:

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P337+P313: Εάν ο οφθαλμικός ερεθισμός επιμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/πρόσβαση.

ΦΥΛΑΞΗ:

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

ΔΙΑΘΕΣΗ:

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εξουσιοδοτημένη μονάδα διάθεσης απορριμμάτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΕΥΗΖΩΣ: *Περιέχει εξαιένδρο χλωριούχο νικέλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση*.

ΚΩΔΙΚΟΣ UFI: MHC0-S07G-000Y-F1GJ

Ekoplön sp. z o.o. sp.k.
Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εφαρμογή του προϊόντος στοχεύει στην πρόληψη και διόρθωση τροφολογικών του αζώτου στα φυτά. Βελτιώνει σημαντικά την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων φρούτων και καρπών. Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση σε περιόδους εντατικής ανάπτυξης των φυτών. Το λίπασμα περιέχει επιπλέον μολυβδαίνιο και τιτάνιο.

ΚΑΤΙΓ (ii) (β)(iii): ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΠΡΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
Λίπασμα Αζώτου N 26% (και Μαγνησίου Mg 3,1%) που περιέχει μικροθρεπτικά συστατικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: [% m/m]:

Ολικό άζωτο (N), που περιλαμβάνει	26,0 %
-νιτρικό άζωτο (NO ₃)	4,3 %
-αμμωνιακό άζωτο (NH ₄)	3,2 %
-ουρικό άζωτο (NH ₂)	18,5 %
Οξείδιο του μαγνησίου (MgO) υδατοδιαλυτό	3,2 %
Μολυβδαίνιο (Mo) με τη μορφή υδατοδιαλυτού αλάτος αμμωνίου	0,001 %

Το προϊόν περιέχει επιπλέον τιτάνιο (Ti) - 0,026%.
Υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα πολλαπλών συστατικών σε διάλυμα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

ουρία nr CAS: 57-13-6 (ΚΣΥ 1; Ουσίες και μείγματα παρθέτων υλικών/πυ),
νιτρικό αμμώνιο nr CAS: 6484-52-2 (ΚΣΥ 1), εξαιένδρο νιτρικό μαγνησιο nr
CAS: 13446-18-9 (ΚΣΥ 1), μονοένδρο κτρικό οξύ nr CAS: 5949-29-1 (ΚΣΥ 1).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τη δόση. Οι θερμοκρασίες να εκτελούνται το πρωί ή το βράδυ σε μέγιστη θερμοκρασία 25°C. Η ελάχιστη θερμοκρασία του υγρού εργασίας είναι 10°C.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΜΙΞΕΤΕ ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΓΕΞΕΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΓΜΑ.

Αυτές είναι γενικές συστάσεις. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.
www.ekoplön.pl

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες για τη συνιστώμενη χρήση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, στην αρχική, κλειστή συσκευασία.

Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία που μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα αντίμετρα.

Φυτό	Περίοδοι εφαρμογής	Δόση (l/ha)
Σιτηρά	Επιμήκυνση στελέχους (BBCH 30-31) Σχηματισμός 1ου 2ου κόμβου (BBCH 32-35) Εκτετατή ταξιανθίας (BBCH 49-51)	3-4
Ελαιοκράμβη	Στάδιο 6-8 φύλλων (σχηματισμός ροζέτας) (BBCH 16-18) Ανάπτυξη βλαστών (BBCH 30) Επιμήκυνση βλαστού (BBCH 32-35) Στάδιο προσανου μπουμπουκίου (BBCH 50-51)	4-10
Αραβόσιτος/ Ηλιανθος	Στάδιο 3-5 φύλλων (BBCH 13-15) Στάδιο 8-10 φύλλων (BBCH 18-19)	3-10
Ζαχαρότευτλο και κτηνοτροφικό τεύτλο	Στάδιο 4-6 φύλλων (BBCH 14-16) Στάδιο 8-10 φύλλων (BBCH 18-19) Πριν από το κλείσιμο των γραμμών (BBCH 38-39)	2-6 2-10
Πατάτα	Βλαστώδης ανάπτυξη (BBCH 22-25) Πριν από την άνθηση (BBCH 57-59) Μετά την άνθηση (BBCH 69)	3-10
Λαχανικά	Στάδιο 2-6 φύλλων, μετά τη φύτευση δενδρυλλίων (BBCH 12-13) Εντατική βλαστική ανάπτυξη και ανάπτυξη των φρούτων μερών για συγκομιδή κάθε 10-14 ημέρες (BBCH 41-49)	3-10
Φάσουλια και μούρα	Πριν από την άνθηση (BBCH 10-59) Τέλος άνθησης (BBCH 67)	2-5
Οπωροφόρα δέντρα και θαμνοί	Πριν από την άνθηση (BBCH 54-57) Μετά την άνθηση 3-4 εβδομάδες κάθε 10-14 ημέρες (BBCH 67-69) Εναρξη ανάπτυξης καρπιδίων (BBCH 71-73)	7-10
Άλλα	1 - 1,5 l λιπάσματος ανά 100 l υγρού	

Ποσότητα υγρού χρήσης (l/ha): 200-300 - αγροτικές αλλεργίες, αγρού, 400-1000 - σπαρτώνες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

Αποθηκεύεται σε ξηρή αποθήκη, μακριά από πηγές θερμότητας και τον ήλιο.
Διάρκεια ζωής - 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.



Ekoplön sp. z o.o. sp.k. | Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów
tel./fax (41) 354 51 69, 312 10 89 | www.ekoplön.pl