

MAXIMUS PKMG

Το Maximus, με τη νέα καινοτόμα φόρμουλα αμινοξέων MPC², προωθεί τη **γρήγορη ανάπτυξη των φυτών**, με αποτέλεσμα τη **καλύτερη χρήση οργανικής λίπανσης** του εδάφους **αποτρέποντας τροφοπενίες των κύριων θρεπτικών συστατικών**.

Η μη-αζωτούχα σύνθεση πηγάζει από τις ανάγκες των φυτών την άνοιξη, όταν πρώτα αποκαθίσταται το ριζικό σύστημα κι ανακατασκευάζεται ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός. Ο φώσφορος που περιέχεται στο λίπασμα βοηθάει στην αναγέννηση και στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και αυξάνει τη φυσική ανθεκτικότητα των φυτών ενάντια στο βιοτικό και αβιοτικό stress. Το κάλιο υποστηρίζει την έναρξη της διαδικασίας ανάπτυξης στα φυτά, ρυθμίζει απευθείας τη διαχείριση του νερού στα φυτά και είναι ιδιαίτερα σημαντικό την αρχή της άνοιξης και κατά την εμφάνιση του stress που σχετίζεται με ξηρασία. Το μαγνήσιο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών.



Καλλιέργεια	Χρόνος Ψεκασμού	Δόση [kg/ha]
Δημητριακά	Άνοιξη – βλαστική ανάπτυξη	3÷5
	Σε περιόδους βιοτικού και αβιοτικού stress	
Καρποφόρα δένδρα και θάμνοι	Πριν την ενεργοποίηση των οφθαλμών	3÷5
	Σε περιόδους βιοτικού και αβιοτικού stress	
Κηπευτικά	Στα 6 φύλλα	3÷5
	Σε περιόδους βιοτικού και αβιοτικού stress	
Ποσότητα υγρού ψεκασμού: καλλιέργεια στον αγρό: 300-500 l/ha; σπυρώνες: 400-1000 l/ha		

Το **MPC²** είναι μια εξειδικευμένη φόρμουλα
παραγώνων αμινοξέων
οργανικών ετεροκυκλικών ενώσεων
σύνθετων ουσιών και
φυσικών αμινοξέων, ΠΟΥ:



Διεγείρει την εντατική ανάπτυξη και φυσική ανάπτυξη - αναγέννηση των φυτών μετά από stress.

Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στα αβιοτικό stress, όπως χαμηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και οξειδωτικό stress.

Μειώνει και Ισορροπεί τις Δραστικές Μορφές Οξυγόνου.

Επιταχύνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται, είτε διαφυλλικά είτε από το έδαφος.

Ενισχύει την παραγωγή ενέργειας.