

SuperFifty®

Εξαιρετικά συμπυκνωμένο εκχύλισμα *Ascophyllum nodosum*, για τη βελτίωση της καρπώδεσης, της παραγωγής και για την προστασία από το αβιοτικό stress.

- Εφαρμόστε το Super Fifty®, πριν από την ανάπτυξη φρούτων και στην αρχική φάση αύξησης του μεγέθους των φρούτων για να βελτιώσετε την εμπορεύσιμη παραγωγή.
- Εφαρμόστε το Super Fifty®, 3 έως 5 ημέρες πριν από το προβλεπόμενο στρες. Αυτό θα προστατεύσει τις καλλιέργειες για 10-14 ημέρες και θα μειώσει τις απώλειες.



ANDERMATT ANTHESIS IKE
Εμ. Μνηστιάδης 8, 14561 Κηφισιά
T 210 8012367 Φ 210 6233196 - E info@anthesis.gr
www.anthesis.gr

Εγγυημένη Σύμβαση Συγκέντρωσης: **495g/l**
Καθαρό Περιεχόμενο: **1 liter**
Καθαρό Βάρος: **1.23 kg**
Ειδική Βαρύτητα: **1.23**

ΚΛΠ 6B. Μη μικροβιακό βιοδιεγέρτης φυτών.
Clash Industrial Estate, Tralee, Co. Kerry, Ireland
T: +353 (0) 66 711 8477 - www.bioatlantis.com
Προϊόν της Ιρλανδίας



Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2018/848 και Καν. (ΕΕ) 2021/1165

Καλλιέργεια	L/Ha	Μέθοδος Εφαρμογής	Στάδια Εφαρμογής	Εγκριμένη ισχύση/ισομ. βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009.
ΠΟΛΥΕΤΗ ΞΥΛΩΔΗ Δενδρώδεις καλλιέργειες : Μηλιά, Αχλαδιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Βερκοκιά, Δαμασκηνιά, Ελιά, Νεκταρινιά, Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά κτλ.), Αβοκάντο, Ακτινιδιά, Αμπέλι κ.α. Ακρόδρυα : Αμυγδαλιά, Καστανιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Πεκάν, Καρυδιά. Τροπικά/Υποτροπικά Φρούτα : Ντούριαν, Μάνγκο, Παπάγια, Ανανάς Φυτά Φυτείας : Καφέ, Κακάο, Τσάι. Μαλακά Φρούτα : Μύρτιλο, Βατόμουρο, Κράνμπερι, Φραγκοστάφυλο, Φράουλα.	2	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • Εμφάνιση Ανθέων • Πλήρης Άνθιση • Αρχική ανάπτυξη των φρούτων • Μετασυλλεκτικά 	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτώνει την καρπώδεση των φρούτων, τη συνολική απόδοση και την εμπορεύσιμη απόδοση.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ Λαχανικά : Αγγούρι, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Μπάμια, Πιπεριά, Κολοκύθα, Κολοκυθάκι, Ντομάτα, Καρπούζι	2	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • Έκπτυξη οφθαλμών • Πλήρης Άνθιση, κάθε 14 ημέρες μέχρι την συγκομιδή. 	
Φασόλι, Αμπελοστάφυλο, Φακή, Ελαιοκράμβη, Αρακάς, Φιστικί, Φασολάκι, Σόγια, Ηλιανθος.	2	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • Πριν την Άνθιση • Έναρξη σχηματισμού του λοβού. 	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτώνει την ανάπτυξη των φρούτων/κονδύλων, τη συνολική απόδοση και την εμπορεύσιμη απόδοση. • Προστατεύει τις καλλιέργειες από το ανεπιθύμητο οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες: <ul style="list-style-type: none"> › Θερμικό στρες: καύσωνας, κρύο › Υδατικό στρες (ξηρασία).
Κονδυλώδη Λαχανικά. Πατάτα, Γλυκοπατάτα.	2	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • Πριν την Έναρξη Κονδυλοποίησης • Διόγκωση Κονδύλων 	
Βολβώδη Λαχανικά : Σκόρδο, Πράσο, Κρεμμύδι, Εσάλोट	2	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • Έναρξη Βολβοποίησης • Διόγκωση Βολβών 	
Ριζώδη Λαχανικά : Παντζάρι, Καρότο, Τζίντζερ, Ραπανάκι, Γογγύλι	1.5	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • 8ο-10ο φύλλο • Ριζική Ανάπτυξη 	<ul style="list-style-type: none"> • Προστατεύει τις καλλιέργειες από χημικό στρες: αλατότητα.
Μπρόκολο, Λαχανάκι Βρυξελλών, Κουνοπιδιά, Λάχανο, Λαχανίδα, Σινάπι	1.5	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • 6ο-8ο φύλλο • Έναρξη σχηματισμού κεφαλής 	
Φυλλώδη Λαχανικά : Σέλινο, Μαρούλι, Μαϊντανός, Σπανάκι, Ραντίτσιο	1.5	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • Φυτά 14-21 ημερών • Σχηματισμός Κεφαλής ή φυτά 35 ημερών 	
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κριθάρι, Καλαμπόκι, Φόνιο, Κεχρί, Βρώμη, Ρύζι, Σόργο, Σιτάρι.	2	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • Σχηματισμός πρώτου κόμβου • Σχηματισμός κορυφαίου φύλλου 	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτώνει την ανάπτυξη των φυτών, τη συνολική απόδοση και την εμπορεύσιμη απόδοση. • Προστατεύει τις καλλιέργειες από το ανεπιθύμητο οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες: <ul style="list-style-type: none"> › Υδατικό στρες ξηρασία › Υδατικός κορεσμός εδάφους.
Μηδική, Άχυρο.	1.5	Διαφυλλικά	<ul style="list-style-type: none"> • Μετά από κάθε κόψιμο και ξανά 7 μέρες αργότερα 	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Διαφυλλική εφαρμογή: Ακολουθήστε το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής που αναφέρεται στον πίνακα εφαρμογής για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητά. Ο τελικός όγκος ψεκαμού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το μέγεθος του φυτού και την φυλλική επιφάνεια, καθώς και με την αποτελεσματικότητα του ψεκαστικού, το μέγεθος των ακροφυσίων και τα χαρακτηριστικά ατμοσφαιρικής. Ο βέλτιστος όγκος νερού για την αραιώση του προϊόντος είναι 300 έως 500 λίτρα νερού ανά εκτάριο. Ο όγκος ψεκαμού στα φύλλα μπορεί να αυξηθεί έως και 1500L για να καλύψει μεγάλα οπισθοφάρα δέντρα με πυκνό φύλλωμα. Να μην αραιωθούν περισσότερο από 2L σε 1500L νερού. Εφαρμόστε ως ομίχλη και βεβαιωθείτε για την πλήρη κάλυψη της καλλιέργειας. Αποφύγετε την υπερβολική δόση και την πτώση μεγαλύτερων σταγονιδίων στα φυτά. Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για βιωσιμή και εντατική παραγωγή τόσο σε οργανικά όσο και σε εμπορικά συστήματα. Προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με ένα οργανοχημικό πρόγραμμα λίπανσης. Ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον θρεπτικά συστατικά για τη βελτίωση της ανάπτυξης των φρούτων σε περίπτωση αυξημένης απόδοσης μετά την εφαρμογή του Super Fifty®. Η προσηλωτική ενός προσκολλητικού αυξάνει την αποτελεσματικότητα **Ψεκασμού μικρού όγκου:** Αραιώστε 40 ml σε μία ψεκαστική μηχανή χωρητικότητας 10 λίτρων. **Αερωψεκασμός:** Εφαρμόστε με τουλάχιστον 50 λίτρα νερού ανά εκτάριο. **Συστάσεις εφαρμογής:** Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν το ανοίξετε. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμπεριλαμβανομένης της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας ή πιθανής βροχής κατά την εφαρμογή. **Συμβατότητα:** Συμβατό με τα περισσότερα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και λιπάσματα. Μπορείτε να καθορίσετε την συμβατότητα με τη χρήση ενός μικρού τεστ (π.χ., δοκιμή με κουβά) πριν από την ανάμιξη στο δοχείο. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των χημικών αυτών στο δοχείο, πρέπει να αραιώσετε καλά τα χημικά σε νερό και στη συνέχεια να προσθέσετε το προϊόν στο αραιωμένο χημικό διάλυμα στο τέλος με ανάμιξη. **Αποθήκευση:** Αποθηκεύστε στα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασία άνω των 5°C (41°F) και μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. **Προσοχή:** Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης/ατμών/αερίων/ομίχλης/ατμών/ψεκασμού. Φορέστε προστατευτικά γάντια/ρούχα προστασίας ματιών/προστασία προσώπου. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος, ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα. **Συστατικά:** Εκχύλισμα *Ascophyllum nodosum* - **KZY 1:** Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών. **Εγγύηση πωλητή:** η εγγύηση του πωλητή είναι περιορισμένη σε όρους που καθορίζονται στην επίκετα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη του κινδύνου σε πρόσωπα και σε ιδιοκτησία που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή το χειρισμό του προϊόντος και αποδέχεται το προϊόν με αυτή την **Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

Παραγωγή & Ημερομηνία λήξης: Δείτε το δοχείο για λεπτομέρειες.