

MISTER C

AE (αερόλυμα, αεροζόλ)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ):
9079/30.03.2017

Φυλάσσεται κλειδομένο. Μακριά από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: (E,E)-8-10-Dodecadien-1-ol 20,9% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 77,5% β/β



Δηλωσείς επικινδυνότητες:

- Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
- Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγή.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει υπηλμία ή ζάλη.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλωσείς Προφυλάξεις:

- Φυλάσσεται κλειδομένο. Μακριά από παιδιά.
- Μακριά από θερμότητα/απνευστήρες/γυμνάσιες/θερμές επιφάνειες - Μην καπνίζετε.
- Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
- Περικέτις υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερόμηνο φύλλο για την καταπολέμηση της καρποκάψας (*Cydia pomonella*). Η φερόμηνη προσελκύει τα αρσενικά ακάκια άτομα του εντόμου-στόχου παρεμποδίζοντας τη σύζευξη των εντόμων. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακάκια άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακάκια, τα αυγά ή τις προνύμφες.

Τρόπος εφαρμογής:

Τοποθετήστε το δοχείο του προϊόντος στην συσκευή αυτόματης διάχυσης, που απελευθερώνει καθημερινά, με ακρίβεια, την απαιτούμενη ποσότητα φερόμης κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Αναρτήστε τη συσκευή σε

μετά τη χρήση.

- Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/τα πρόσωπα.
- Να προστατεύεται από τις ηλικιακές ακτίνες. Να μην εκθιβαθεί σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C.

«Φοράτε γάντια κατά τον χειρισμό του προϊόντος.»

«Μη χαρίζετε άλλους τύπους φερόμωνών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας πρώτα»

- Διεσθία του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- ΜΗ ΡΥΤΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Πρόσες Βοήθειες - Αντίδοτα:

- Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΛΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εδόνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός των οφθαλμών: Αποφύγετε συμπληρωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

Κάτοχος της άδειας:
CBC (Europe) S.r.l.
Via Zanica 25
24050 Grassobbio (BG) - Italia

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Andermat - Anthesis I.K.E.

Επ. Μηχανική 8,
14561, Κηφισιά
Τηλ.: 210-8012 367
info@andermat.com.gr, andermat.com.gr

κλαδί ή πάσαστο στο ανώτερο 1/3 της κόμης του δέντρου και ένα μέτρο μακριά από καρπούς.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το χρησιμοποιούμενο δοχείο (κάνιστρο) μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας, για τη διάσπαψη της μη περαιρωμένης χρήσης, αναοξυθιούνται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα (Δοχείο - Κάνιστρο) / 10 στρέμματα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Μηλιά Αχλαδιά Καρυδιά Φουντουκιά	Καρποκάψα (<i>Cydia pomonella</i>)	3 δοχεία (κάνιστρα) ανά 10 στρέμματα	Πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακακίων	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Τοποθετείστε τα δοχεία του προϊόντος (κάνιστρα) στην συσκευή αυτόματης διάχυσης πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακακίων του εντόμου.
2. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης, ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις και συμβουλευτείτε τις Γεωργικές Προσευδοποιήσεις.
3. Μία εφαρμογή αρκεί για να καλύψει όλη την καλλιεργητική περίοδο, ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές συνθήκες.
4. Μετά τον προγραμματισμό και την τοποθέτηση των απαιτούμενων συσκευών αυτόματης διάχυσης, σύμφωνα με την συστασμένη δόση (ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλιέργειας και την πίεση της προβλήθ), ενεργοποιήστε το σκεύασμα.
5. Τοποθετήστε ομοίωμορα τα δοχεία του σκευάσματος μέσα στο αγροτεμάχιο, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη συγκέντρωση της φερόμης, όπως ο άνεμος, η ποιογραφία, η διάταξη των φυτών και η πιθανότητα προσβολών από γενεονοκίους σπαρωνών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Καρυδιά, Φουντουκιά: Μη εφαρμοσίμο

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Αλλοζέτες γόνιμα όταν έχετε πιάσει προηγουμένως άλλες φερόμες.

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλους σπαρωνών ή όταν τοποθετούνται διασπύρες σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατευθούν ακόμα και μικροί σπαρωνές, όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων ή όταν οι γενεονοκίους σπαρωνών ακολουθούν επίσης παρόμοια προγράμματα αντιμετώπισης του εντόμου. Σπαρωνές με χαμηλούς πληθυσμούς εντόμων, προστατεύονται επαρκώς με το σκεύασμα. Σε αγρούς με μεσαίους και υψηλούς πληθυσμούς είναι απαραίτητη η συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων, ειδικά το πρώτο έτος και στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, για να μειωθεί ο πληθυσμός του εντόμου. Η συνδυασμένη χρήση εντομοκτόνων δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος. Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γενεονοκίους αγρούς μπορεί να προκαλέσουν ζημιές, γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικό έλεγχοι στους καρπούς, ώστε να αποσπαστεί εάν χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο. Σε περίπτωση εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών (50 καρπούς στην άκρη του αγροτεμαχίου ή, 100 στο κέντρο του) πραγματοποιείστε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα.

Στογεία φωτοζιζτικότητα: Δεν είναι φυτοζιζκό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συστασμένες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Καρυδιά, Φουντουκιά: Μη εφαρμοσίμο

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε ήπιο, δροσερό (σε θερμοκρασία 20°C) και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για τρία (3) έτη. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης, θερμότητας και ηλιακό φως. Προστατεύστε το προϊόν από έκθεση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50°C.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 190 g

Andermatt
Anthesis

BIOGARD
biological First!

LFH: 5500-YCAA-K009-Y917



EL

Rev. 10-2025

520 3