

RAPAX AS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια καταπόσεως του *Bacillus thuringiensis*. Οι παραγόμενες πρωτεΐνες (τοξίνες) του βακτηλίου με κρυσταλλική μορφή, καταστρέφουν τα επιθηλιακά κύτταρα στο μεσέντερο των εντόμων με αποτέλεσμα την καταστροφή του εντερικού σωλήνα και τον θάνατο των προνυμφών σε διάστημα λίγων ημερών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώδους με συμβατικούς ψεκαστήρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστάμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Το ψεκαστικό μίγμα να χρησιμοποιείται μέσα σε 12 ώρες μετά από την παρασκευή του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξασφαλιστούν πλήρως ο αερός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει πρέπει να αραιώνεται με νερό και να ψεκάζεται στην περιοχή που έχει ήδη γίνει εφαρμογή. Οι κενές φιάλες ξεπλύνονται από πίσω με ειδικό ξεπλυστικό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό), και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, και εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή

ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Περιέχει *Bacillus thuringiensis* subspecies *kurstaki* strain EG 2348. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτική ενδυμασία / μέσα αποικιακής προστασίας για τα μάτια/πόδια/σώμα. Φοράτε απόλυτη φόρμα εργασίας, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη / φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Οι εργάτες να φορούν απόλυτη φόρμα εργασίας και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να αποφευχθεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα άμεσα με νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε άμεσα με νερό και σαπούνι την περιοχή που έχει έλθει σε επαφή με το προϊόν.

Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα.

Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
(210) 7793777

Rev. 01-2026



RAPAX® AS

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis* subsp.

kurstaki strain EG 2348, 22,56 % β/o ή

24.000 IU T.ni/mg

Βοηθητικές ουσίες: 81,2 % (β/β)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (YAAT): 14753/31.08.2020

Andermatt Anthesis

Εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848 όπως κάθε φορά ισχύουν.



Κάτοχος της άδειας: CBC (Europe) S.r.l.
Via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG), Italia
T: 0039-035-335313 F: 0039-035-335334
E: infobiogard@cbceurope.it

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά: Anthesis IKE
Εμ. Μνεάνιν 8 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
T: 210-8012 367, info@anderstatt.com.gr,
www.anderstatt.com.gr

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ).

- **ΕΣΠΕΡΙΔΟΙΔΗ:** Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Πράσινα Λεμόνια (Λόμυ), Μανταρινιά, Γκρέιφφρουτ: Ανδοτήρης (*Prays citri*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΜΑΛΟΙΔΗ:** Μηλιά, Αυθαρία, Κυδωνιά: Φυλλόβροχτες: (*Pandemis cerasana*, *Archips podana*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** Ροβωνιά, Βερικονιά, Δαμασκηλιά, Κερασία: Καρπόκαθα (*Cydia molesta*), Ανάρα (Anarsia lineatella). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΑΜΕΛΙΑ:** (ονομαστικά με επιπρόσθετα σταφύλια) Ευθεία (*Lobesia botrana*) Εφέστια (*Ephesia* spp.). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 75-100 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 10-150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΕΛΙΑ**
Πυρηνότρητης (*Prays oleae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ**
Προνύμφες Λεπιδοπτερόν (*Argyrotaenia pulchella*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΣΟΛΑΝΩΔΗ:** Τομάτα (β), Πιπεριά (γ), Μελιτζάνα (γ+δ) Σποπόττερα (*Spodoptera littoralis*), Ουλιόρνητος τομάτας (*Tuta absoluta*), Πρόσινο ακοκκίτη (*Helicoverpa armigera*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΑΓΚΙΝΑΡΑ**
Κάμια αγκινάρας (*Gortyna xanthenes*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή μετά την ωρίμανση των φυλλώματων (BBCH=19) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα.
- **ΦΑΣΟΛΙΑ (γ+δ)** (φρέσκα και ξηρά)
Πρόσινο ακοκκίτη (*Helicoverpa armigera*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΒΑΜΒΑΚΙ**
Πρόσινο ακοκκίτη (*Helicoverpa armigera*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φυλλώματων (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-150 λίτρα / στρέμμα.
- **ΔΑΙΚΙΑ ΔΕΝΔΡΑ**
Φυλλόφαγες προνύμφες: Πτιχομήνη (*Thaumetopoea pityocampa*, *Thaumetopoea processiona*). Ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60-200 λίτρα / στρέμμα.
- **ΑΒΑΘΟΣΙΤΕΣ**
(*Spodoptera frugiperda*)* Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των καρπών (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. (Χρ.Ηα.Σμ.)
- **ΦΑΥΛΑΙΑ (β)**
(*Spodoptera frugiperda*)* Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των καρπών (BBCH=80) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. ΔΟΣΗ: 100-200 κ.ε/στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. (Χρ.Ηα.Σμ.)

Παρατηρήσεις:
1. Φυλάσσετε μακριά φανόνων οι νεαρές προνύμφες και παρατηρούν οι πρώτες ζημιές και επανοστάσεις κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλή διαβροχή όλης της φυλλώσης επιφανείας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταποθούν το σκεύασμα.
Μετά την κατάρπηση οι κάμψες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.
2. Μην ψεκάζετε εάν υπάρχουν βροχή. Εάν βρέξει (ασθενήματα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.
3. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προβόχης.
4. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται τις πιο θερμές ώρες της ημέρας.

• Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες της τομάτας (γ), πιπεριάς (γ) και του βαμβάκι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουσίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.
• Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδοκυβερνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φρούτας και του αραβοσίτου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουσίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΜΕΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Πράσινα Λεμόνια, Μανταρινιά, Γκρέιφφρουτ), ΜΑΛΟΙΔΗ (Μηλιά, Αυθαρία, Κυδωνιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροβωνιά, Βερικονιά, Δαμασκηλιά, Κερασία), ΑΜΕΛΙΑ (ονομαστικά με επιπρόσθετα σταφύλια), ΕΛΙΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, ΣΟΛΑΝΩΔΗ (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα), ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ (γ+δ) (φρέσκα και ξηρά), ΒΑΜΒΑΚΙ, ΚΑΠΝΟΣ, ΔΑΙΚΙΑ ΔΕΝΔΡΑ, ΑΒΑΘΟΣΙΤΕΣ, ΦΑΥΛΑΙΑ (β): 3

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΜΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΒΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Όλες οι καλλιέργειες: Δεν ορίζεται

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΗΘΕΣ ΓΕΩΤΡΙΧΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΙΕΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διακριτική ανθεκτικότητα: Το σκεύασμα περιέχει *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain (EG 2348), που ανήκει στην ομάδα 11 κατά IRAC.

Να μη χρησιμοποιείται νερό για ψεκασμό με pH άνω του 8, αλλιώς να χρησιμοποιείται παραδοσιακό σόδα.
Δεν συνδυάζεται με ορμονικά προϊόντα όπως Βορβογλιόλες ποτίες, πολυβιταμινω σκευάσματα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστάμενες δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΠΟΒΗΚΕΥΣΗ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται το προϊόν στη φρεσκάδα, ξηρά και κατά αεριζόμενο χώρο. Σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) το προϊόν παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Κλείστε ξανά τη συσκευασία εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί όλο το περιεχόμενο.

Αρ. Παράδοσης - Ημερ. Παραγωγής: Βρίσκει επί συσκευασίας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 L