ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Περιέχει *Aureobasidium pullulans*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν **ανοσοανεπάρκεια** ή διατελούν υπό θεραπεία με **ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.**

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
• Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
• ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
• Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στις καλλιέργειες: **αμπέλι και τομάτα**, να αφήνετε αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή αψέκαστη ζώνη προστασίας **3 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%.**

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
• Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
• Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μεταφέρετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη, σε καλά αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από την υποθερμία.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυνετέ τα κρατώντας τα ανοιχτά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Andermatt Anthesis

I000129GR2726
ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αναγράφονται πάνω στη συσκευασία

9 010984 000010

SAN AGROW

BOTECTOR® (Μποτέκτορ)

Μυκητοκτόνο

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Δραστική ουσία: *Aureobasidium pullulans* DSM 14941: $2.5*10^9$ έως $2.5*10^{10}$ cells/g ή 50 έως 500 g/Kg
Aureobasidium pullulans DSM 14940: $2.5*10^9$ έως $2.5*10^{10}$ cells/g ή 50 έως 500 g/Kg

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ - ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 61096/06-12-2022

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Κάτοχος της άδειας:
SAN Agrow Holding GmbH
Industriestraße 20, 3130
Herzogenburg, Αυστρία
Τηλ.: +43 2782 83300
e-mail: sanagrow-at@san-group.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Andermatt - Anthesis ΙΚΕ
Εμ. Μπενάκη 8, 145 61 Κηφισιά
Τηλ. : (+30) 210 80 12 367
Email : info@andermatt.com.gr

Καθαρό Βάρος: **1 kg** ℮

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση, το οποίο δρα μέσω ανταγωνισμού για θρεπτικά στοιχεία και χώρο στην επιφάνεια του φυτού, παρεμποδίζοντας την εγκατάσταση και ανάπτυξη των παθογόνων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Πεδίο Εφαρμογής: Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες) VITVI
Στόχος: ΒΟΤΡΥΤΗΣ (*Botrytis cinerea* BOTRCI), **Δόση:** 40 -100[1] γρ/στρέμμα,
Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα,
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των ραγών. (Άνοιξη-Φθινόπωρο) BBCH 68-89, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4

Πεδίο Εφαρμογής: Φράουλα Υπαίθρου FRAAN, **Στόχος:** ΒΟΤΡΥΤΗΣ (*Botrytis cinerea* BOTRCI), **Δόση:** 70 -100 γρ/στρέμμα, Όγκος ψεκ. υγρού: 60-200 λίτρα/στρέμμα,
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 61-89, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 6

Πεδίο Εφαρμογής: Σολανώδη Υπαίθρου: TOMATA LYPES,
Στόχος: ΒΟΤΡΥΤΗΣ (*Botrytis cinerea* BOTRCI), **Δόση:** 50 -100 γρ/στρέμμα, **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5

Πεδίο Εφαρμογής: Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά PRNPS, PRNPN, Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO, Κερασιά PRNAV, PRNCE, **Στόχος:** ΜΟΝΙΛΙΑ (*Monilia spp.* 1MONIG), ΒΟΤΡΥΤΗΣ (*Botrytis cinerea* BOTRCI), **Δόση:** 100 γρ/στρέμμα, **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 61-89, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 6/7
Πεδίο Εφαρμογής: Αμυγδαλιά PRNDU, PRNDA, **Στόχος:** ΜΟΝΙΛΙΑ (*Monilia spp.* 1MONIG), ΒΟΤΡΥΤΗΣ (*Botrytis cinerea* BOTRCI), **Δόση:** 100 γρ/στρέμμα, **Όγκος ψεκ. υγρού:** 1000L/10000 m^2 LWA, **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 61-89, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 6/7

Πεδίο Εφαρμογής: Καρποί βάτου (Υπαίθρου): Βατόμουρα RUBFR, Καρποί ασπροβατομουριάς RUBCA, Σμέουρα RUBID, Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (Υπαίθρου): Μύρτιλλα VACCO, Μύρτιλλα μακρόκαρπα VACOX, Φραγκοστάφυλα (μαύρο, κόκκινο, λευκό) RIBNI & RIBRU, Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) RIBUC, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς ROSCN, Βατόμουρα (μαύρα, άσπρα) MORAL, Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα) CSCAZ, Καρποί κουφοξυλιάς SAMNI, **Στόχος**: ΒΟΤΡΥΤΗΣ (*Botrytis cinerea* BOTRCI), **Δόση:** 100 γρ/στρέμμα, **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα,
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από την εμφάνιση της ταξιανθίας έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 51-89, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 6/7

Πεδίο Εφαρμογής: Αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη (Υπαίθρου) VITVI, Βότανα και βρώσιμα άνθη 3HERC (Υπαίθρου): Φραγκομαϊντανός ANRCE, Σχοινόπρασο ALLSC, Σέλινο APUGV, Μαϊντανός PARCR, Φασκόμηλο SALOF, RMSOF, Θυμάρι THYPR, Βασιλικός OCIBA, Δάφνη/ δαφνόφυλλα LURNO, Δρακόντιο ARTGL, **Στόχος**: ΒΟΤΡΥΤΗΣ (*Botrytis cinerea* BOTRCI), Δόση: 100 γρ/στρέμμα, **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 3ου πραγματικού φύλου έως την συγκομιδή BBCH 13-49, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 5/7

Πεδίο Εφαρμογής: Πιπεριά (Θερμοκηπίου) CPSAN, **Στόχος**: ΒΟΤΡΥΤΗΣ (*Botrytis cinerea* BOTRCI), ΣΚΛΗΡΩΤΙΝΙΑ (*Sclerotinia* 1SCLEG) **Δόση:** 100 γρ/στρέμμα, **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση της ταξιανθίας έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 51-89, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 5/7

Andermatt Arthesis

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Στο Αμπέλι εφαρμόστε την ελάχιστη δόση (40 γρ./στρέμμα) για εφαρμογή μόνο σε σταφύλια. Εφαρμόστε τη μεγαλύτερη δόση (100 γρ./στρέμμα) για εφαρμογή σε όλο το πρέμνο.
2. Το σκεύασμα έχει μέτρια αποτελεσματικότητα η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
3. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στις καλλιέργειες κερασιάς και δαμασκηνιάς. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αυτές από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σε αυτές τις καλλιέργειες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
ΠΕΔΙΟΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ: Αμπέλι (0151000), Τομάτα (0231010), Φράουλα (0632010), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020), Αμυγδαλιά (0120010), Βατόμουρα (Υ) (0153010), Καρποί ασπροβατομουριάς (Υ), (0153020), Σμέουρα (Υ) (0153030), Μύρτιλλα (Υ) (0154010), Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Υ) (0154020), Φραγκοστάφυλα (μαύρο, κόκκινο, λευκό) (Υ) (0154030), Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (Υ) (0154040), Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς (Υ) (0154050), Βατόμουρα (μαύρα, άσπρα) (Υ) (0154060), Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα) (Υ) (0154070), Καρποί κουφοξυλιάς (Υ) (0154080), Αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη (Υ) (0253000), Φραγκομαϊντανός (Υ) (0256010), Σχοινόπρασο (Υ) (0256020), Σέλινο (Υ) (0270030), Μαϊντανός (Υ) (0256040), Φασκόμηλο (Υ) (0256050), Θυμάρι (Υ) (0256070), Βασιλικός (Υ) (0256080), Δάφνη/δαφνόφυλλα (Υ) (0256090), Δρακόντιο (Υ) (0256100), Πιπεριά (Θ) (0231020)
ΡΗΙ (σε ημέρες): ---

Andermatt Anthesis

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Διαφυλικοί ψεκασμοί καλύψεως.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε τα 2/3 του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος BOTECTOR® στο ψεκαστικό δοχείο με συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.
Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25° C.
Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών.
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνετε τα πολλές φορές, ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό/βυτίο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -------

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Είναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25° C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών. Το μίγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε κατάλοιπα στο ψεκαστικό δοχείο. Για την καταπολέμηση του Βοτρύτη, η χρήση άλλων μη συνδυαζόμενων μυκητοκτόνων σκευασμάτων πρέπει να απέχει 3 ημέρες από την εφαρμογή με το BOTECTOR®

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων στο BOTECTOR® είναι χαμηλός.
Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με εντομοκτόνα από διαφορετικές χημικές ομάδες και που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, εναλλαγή καλλιεργειών και εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Να μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Andermatt Anthesis

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Διατηρείστε το μόνο στην αρχική του συσκευασία. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Αποθηκεύσατε σε ερμητικά κλειστή συσκευασία σε ψυχρό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Σταθερότητα Αποθήκευσης:
- 18 μήνες σε θερμοκρασία 20°C,
- 30 μήνες σε θερμοκρασία 8°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων και διεξοδικών δοκιμών και μελετών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παραμένουν εκτός του ελέγχου μας (προετοιμασία του μείγματος, τρόπος χρήσης, καιρικές συνθήκες κ.λπ.). Ως εκ τούτου, αναλαμβάνουμε ευθύνη μόνο για τη διασφάλιση της σταθερής ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Ο κίνδυνος πιθανής ζημίας (αναποτελεσματικότητα, τοξικότητα, αναμίξεις στο δοχείο κ.λπ.) που προκύπτει από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση ή προκαλείται από παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου μας (όπως η ακατάλληλη αποθήκευση) βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Επίσης, αποκλείουμε – στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο – κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες ή ζημίες.

Το BOTECTOR αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα εταιρείας-μέλους του Ομίλου SAN Group (IR-1008746).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Περιέχει *Aureobasidium pullulans*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν **ανοσοανεπάρκεια** ή διατελούν υπό θεραπεία με **ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.**

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
• Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
• ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
• Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στις καλλιέργειες: **αμπέλι και τομάτα**, να αφήνετε αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή αψέκαστη ζώνη προστασίας **3 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%.**

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
• Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
• Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μεταφέρετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη, σε καλά αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από την υποθερμία.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυνετέ τα κρατώντας τα ανοιχτά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Andermatt Anthesis

1000129GR2726

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αναγράφονται πάνω στη συσκευασία

9 010984 000010

SAN AGROW

BOTECTOR® (Μποτέκτορ)

Μυκητοκτόνο

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Δραστική ουσία: *Aureobasidium pullulans* DSM 14941: $2.5*10^9$ έως $2.5*10^{10}$ cells/g ή 50 έως 500 g/Kg
Aureobasidium pullulans DSM 14940: $2.5*10^9$ έως $2.5*10^{10}$ cells/g ή 50 έως 500 g/Kg

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ - ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 61096/06-12-2022

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Κάτοχος της άδειας:
SAN Agrow Holding GmbH
Industriestraße 20, 3130
Herzogenburg, Αυστρία
Τηλ.: +43 2782 83300
e-mail: sanagrow-at@san-group.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Andermatt - Anthesis ΙΚΕ
Εμ. Μπενάκη 8, 145 61 Κηφισιά
Τηλ. : (+30) 210 80 12 367
Email : info@andermatt.com.gr

Καθαρό Βάρος: **1 kg** ℮