Trifolio-M
Hochreine Biosubstanzen

Κάτοχος της άδειας:
Trifolio-M GmbH
General contact: Trifolio-M GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
35633 Lahnau, Germany
T: +49 6441 20977-0
E: info@trifolio-m.de,
www.trifolio-m.de

Andermatt
Anthesis

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ANDERMATT – ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8, 14561 Κηφισιά – Αθήνα
T: +30 210 8012367
E: info@andermatt.com.gr
www.andermatt.com.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Azadirachtin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΙΔΙΑ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Andermatt Anthesis

Αρ. Παρτίδας – Ημ. Παραγωγής:
Βλέπε επί συσκευασίας

Κατάλληλο για ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

NeemAzal®-T/S

Biogarden

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Δραστική ουσία: Azadirachtin A 1% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 96% β/β

ΑΑΔΑ: 14789/EP/10.12.2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 10 κ.εκ.

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με διασυστηματική δράση

Ανοίξτε εδώ ▶

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ):

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου): Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp.),* **Πράσινο Σκουλήκι** *(Helicoverpa armigera),* **Σποντόπτερα** *(Spodoptera exigua).* Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85),με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. **ΔΟΣΗ:** 2-3 κ.εκ / 10τ.μ.**Όγκος ψεκ. υγρού:** 500 - 1500 κ.εκ. / 10τ.μ.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερμοκηπίου): Αλευρώδεις *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)* **Θρίπες** *(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp.),* **Φυλλοκνίστες** *(Tuta absoluta, Liriomyza sp.).* Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. **ΔΟΣΗ:** 2-3 κ.εκ / 10τ.μ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 500 - 1500 κ.εκ. / 10τ.μ.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου + Θερμοκηπίου): Δορυφόρος *(Leptinotarsa decemlineata)* Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. **ΔΟΣΗ:** 2-3 κ.εκ / 10τ.μ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 500 - 1500 κ.εκ. / 10τ.μ.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θερμοκηπίου): Αφίδες *(Aphis gossypii, Myzus persicae),* **Αλευρώδεις** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)* **Θρίπες** *(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp.).* Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. **ΔΟΣΗ:** 2-3 κ.εκ / 10τ.μ.**Όγκος ψεκ. υγρού:** 500 - 1500 κ.εκ. / 10τ.μ.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου): Αφίδες *(Aphis gossypii, Myzus persicae),* **Αλευρώδεις** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)* **Θρίπες** *(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp.)* **Πράσινο Σκουλήκι** *(Helicoverpa armigera),* **Σποντόπτερα** *(Spodoptera exigua).* Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. **ΔΟΣΗ:** 2-3 κ.εκ / 10τ.μ.**Όγκος ψεκ. υγρού:** 500 - 1500 κ.εκ. / 10τ.μ.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Θερμοκηπίου): Αφίδες *(Aphis gossypii, Myzus persicae),* **Αλευρώδεις** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)* **Θρίπες** *(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp.)* **Φυλλοκνίστες** *(Lyriomyza sp.,Phytomyza sp.).* Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85), με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. **ΔΟΣΗ:** 2-3 κ.εκ / 10τ.μ.**Όγκος ψεκ. υγρού:** 500 - 1500 κ.εκ. / 10τ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1.Να εφαρμόζετε κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας. 2.Να ψεκάζετε απουσία ανέμου. 3.Η δόση μεταξύ 200-300κ.εκ. ανά στρέμμα εξαρτάται από το επίπεδο της προσβολής. 4.Πριν τη χρήση του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα για τον έλεγχο φυτοτοξικότητας.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Ροδακινιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Καλλωπιστικά (Υ+Θ): **3**

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Ροδακινιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Καλλωπιστικά (Υ+Θ): **3 ΗΜΕΡΕΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με διασυστηματική δράση. Η δραστική του ουσία είναι προϊόν εκχύλισης των απόρων του τροπικού φυτού *Azadirachta indica,* δέντρο του Νιμ (Neem). Δρα μέσω επαφής και κατάποσης ως ρυθμιστής ανάπτυξης, παρεμβαίνοντας στην εξέλιξη των εντόμων στα στελέχη στάδια. Παράλληλα, παρεμποδίζει την σύνθεση εκδυσόνης (ορμόνη που ελέγχει την έκδυση). Έχει επίσης αντιτροφικές και απωθητικές ιδιότητες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος σε ποσοστό 30-50%. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό ανάλογα με τις απαιτούμενες συνεχώς. Για καλύτερα αποτελέσματα, το pH του ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να διατηρείται όξινο (pH 4,5-6). Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και υπό συνεχή ανάδευση.

Andermatt Antithesis

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το ακεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Azadirachtin A, εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα UN (compounds of unknown or uncertain MoA) κατά IRAC.

Το προϊόν δεν είναι συμβατό με προϊόντα πολύ όξινης (π.χ όξινες αργίλους) ή πολύ αλκαλικής αντίδρασης (π.χ. πολυθειούχο ασβέστιο, βορδιγάλειος πολτός κ.λ.π.)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ή για προσβίαση του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 24 ώρες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για ένα (1) χρόνο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Να Φοράτε πάντα γάντια κατά τη χρήση».

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία».

Μη ρυπαίνετε εργαλεία με το προϊόν ή τη συσκευασία του, (Να μην καθαρίζετε τον ψεκαστήρα κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση τροφίμων, ζωοτροφών από αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

– μια ασφάκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης για πρώιμες εφαρμογές ή 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης για όψιμες εφαρμογές σε καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων.

– μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε καλλιέργειες καλλωνιστικών.

– μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού και καλοκυθιού.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια ασφάκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- **10 μέτρων** σε συνδυασμό **με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 80%** σε καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων,
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό **με χρήση ακροφυσίων της διασποράς του ψεκαστικού κατά 30%** σε καλλιέργειες καλλωνιστικών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Adermatt Anestis